



STOMIE ET COMPLICATIONS

**Des « boutons » sont apparus
au niveau de la stomie**




FICHE N°5

**Union
d'Associations Françaises
de Stomisés**

5. Des « boutons » sont apparus au niveau de la stomie

Observer attentivement la **localisation des lésions** :

- Soit **SUR LA MUQUEUSE** de la stomie : Non douloureuses, il peut s'agir de polypes. Ce sont des petites excroissances de la muqueuse. Ces tumeurs, bénignes le plus souvent, peuvent cependant dégénérer. Seul, votre référent médical (chirurgien, gastro-entérologue ou oncologue) décidera de la conduite à tenir. Aucun geste ne doit être pratiqué sans son avis.
- Soit **AU NIVEAU DE LA JONCTION PEAU-MUQUEUSE**: Ces lésions sont des bourgeons péristomiaux constitués d'un amas de tissu, charnu, arrondi, douloureux, saigne facilement.



- **Causes :**
Retrait des fils péristomiaux tardif :
Une ablation des points de suture péristomiaux aux environs du 12ème jour post-opératoire prévient le risque de formation de ces bourgeons. Le maintien des fils au-delà de ce délai entraîne une réaction inflammatoire qui génère une hyper cicatrisation et l'apparition des bourgeons. Le frottement de l'appareillage aggrave les lésions.
- **Conséquences :**
Ces bourgeons entraînent le plus souvent des petits saignements, de la douleur, une gêne à l'appareillage.
- **Vous pouvez ...**
Consulter un.e stomathérapeute ou un.e référent.e en stomie qui vous informera et vous accompagnera dans la conduite à tenir :
 - Le traitement consiste à l'application d'un dermocorticoïde liquide (pas de crème) sur les lésions. Si échec, l'application de nitrate d'argent sous forme de crayon peut être pratiquée par un professionnel de santé. Ces soins seront effectués uniquement sur prescription médicale.
 - Ajuster l'appareillage pour éviter les frottements sur les lésions (élargir la découpe de 2 à 3 mm)
 - Dans tous les cas, un avis spécialisé est nécessaire